

ご使用者様のコメント

- 地温に関係なく、発根促進がみられました。
- 発根(側根)促進により、グリーンのコmpactionが上がり、ピッチマークが減りました。

*上記コメントは、過去の使用事例であり、本資材の効果を保証するものではありません。

対象芝草・芝地	月間・年間 推奨回数	推奨使用量 (m ²)	推奨散布水量 (m ²)	推奨時期	推奨方法・注意事項
ベントグリーン	2回/月	0.5ml	300~500ml	全生育 期間中	<ul style="list-style-type: none"> *散布は0.5ml/m²での散布をお勧めします。 *生育最盛期の5月、6月、10月は0.5ml/m²で月に2回の散布をお勧めします。 *軸が下がり、葉っぱが立つ効果が期待できます。 *成長能(growth potential)が高くなる3月4月には地上部の生育をゆるやかにするために、0.5ml/m²で月に2回の散布をお勧めします。 *寒冷期の11月~2月で地上部があまり生長しない成長能が低い時期でも0.25ml/m²で月に2回の散布をお勧めします。 *降雪地域では根雪前に、0.5ml/m²での散布をお勧めします。 *更新作業に合わせて散布すると、直接根に処理ができますので、作業2週間前と直後に0.5ml/m²で散布水量を多めにして散布してください。
高麗グリーン	1回/月	0.5ml	500ml/m ² か 100~200ml/m ² で後散水	休眠期 以外の 全育成 期間中	<ul style="list-style-type: none"> *生育初期の散布は0.5ml/m²での散布をお勧めします。有効性を確認後は0.25ml/m²での散布をお勧めします。 *生育最盛期の7月~9月には地上部の生育を緩やかにし根量を増やす適期ですので、0.5ml/m²で月に2回の散布をお勧めします。 *休眠期前散布は0.5ml/m²で散布水量を多めにして散布して下さい。 *更新作業に合わせて0.5ml/m²で散布水量を多めにして散布してください。
ウルトラドワーフ グリーン	1回か2回/月	0.5ml	500ml/m ² か 100~200ml/m ² で後散水	寒冷期 以外の 全生育 期間中	<ul style="list-style-type: none"> *生育初期の散布からは0.5ml/m²での散布をお勧めします。 *生育最盛期や低温期や日照量の少ない時期や日陰のグリーンは、0.5ml/m²で月に2回の散布をお勧めします。
暖地型芝草の ティグラウンド	1回/月か刈込 軽減のためには 2回/月	0.5ml	500ml/m ² か 100~200ml/m ² で後散水	寒冷期 以外の 全生育 期間中	*面積の少ないティや日陰のティは損傷軽減と回復のため刈込負担を軽減するために、0.5ml/m ² で月に2回の散布をお勧めします。
寒地型芝草の ティグラウンド	1回/月か刈込 軽減のためには 2回/月	0.25~0.5ml	500ml/m ² か 100~200ml/m ² で後散水	全生育 期間中	*面積の少ないティや日陰のティは損傷軽減と回復のため刈込負担を軽減するために、0.5ml/m ² で月に2回の散布をお勧めします。
アプローチ (寒地型・暖地型芝草)	1回/2ヶ月	0.5ml	500ml/m ² か 100~200ml/m ² で 後散水か雨後散水	全生育 期間中	*病症や乾燥・過湿のダメージが多いエリアには0.5ml/m ² で月に1回の定期散布をお勧めします。
フェアウェイ・平垣ラフ (寒地型・暖地型芝草)	1回/3ヶ月	0.25~0.5ml	100~200ml/m ² で 後散水か雨後散水	全生育 期間中	<ul style="list-style-type: none"> *除草剤と混用散布する場合は、小面積テスト散布をお勧めします。 *茎葉除草剤のm²当りの投下量は、テスト散布にて薬量をご確認ください。
法面ラフ (寒地型・暖地型芝草)	1回/3ヶ月~ 5ヶ月	0.25~0.5ml	雨後に60mlの極小 散布カス/マター散布	全生育 期間中	<ul style="list-style-type: none"> *刈込軽減と徒長抑制が期待できます。 *除草剤と混用散布する場合は、小面積テスト散布をお勧めします。
ソッド・張芝 (寒地型・暖地型芝草)	作業中か 作業直後 1回/2週間/月	0.5ml	500ml/m ² 以上	作業中か 作業直後	*1000倍希釈液にドブ掛け処理が最善ですが、改善の方法として0.5ml/m ² で散水量は500ml/m ² 以上の水量散布をお勧めします。
スポーツフィールド (サッカー場他)	2回/月	0.5ml	100~200ml/m ² で後散水	全生育 期間中	*芝草の損傷を軽減させプレー性を向上させるためにも月に2回の定期散布をお勧めします。

製造元 SHK 清和肥料工業株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町 4-3-4
TEL: 06(6203)6811 FAX: 06(6229)0359

北海道支店 TEL: 011-223-2400 FAX: 011-218-7444
仙台営業所 TEL: 022-212-1125 FAX: 022-266-0598
東京支店 TEL: 03-5835-1182 FAX: 03-3861-2811
和歌山支店 TEL: 073-445-2849 FAX: 073-445-2875
中国四国支店 TEL: 0866-57-9850 FAX: 0866-57-9845
山陰営業所 TEL: 0859-27-2559 FAX: 0859-27-4645
四国営業所 TEL: 088-847-2295 FAX: 088-847-2275
九州支店 営業統括部 TEL: 096-338-1525 FAX: 096-339-9507

ゴルフ芝(スポーツターフ)専用液肥

農水省登録 生第 101445号

発根促進 根活性向上

土壌の酸化還元電位を下げる

ビール酵母細胞壁(β-グルカン)配合

エクストラターフ
EXTRA TURF

Fe
(鉄として)

1-5-5-0.5

日本の大手ビール会社を傘下に持つ「アサヒグループホールディングス株式会社」の研究開発(特許第 5555818号)により誕生したビール酵母細胞壁の分解物(βグルカン断片)を配合したゴルフ芝(スポーツターフ)専用液肥です。

荷姿: 10×10本入/100 CBテナー

オールシーズン施用可能
NEW「二価鉄」を配合



製造元 SHK 清和肥料工業株式会社

